

UN CASO DI MORBO DI GRAVES-BASEDOW

Dr.ssa Innocenza Berni

Medico Chirurgo – Omeopata

innoberni@gmail.com

Introduzione

Viene presentato il caso di una paziente di 40 anni con di morbo di Graves–Basedow.

Materiali e metodi

E. viene in studio il 13 aprile 2021 con diagnosi di morbo di Graves–Basedow e con una serie di sintomi ad esso correlati.

Al momento assume Inderal da 40 mg, mezza cps 2 volte al dì, per tachicardia che la paziente avverte come molto invalidante.

Si esegue la visita medica prendendo in esame tutti i sintomi fisici e mentali e procedendo poi all'esame obiettivo. Il quadro clinico ottenuto viene confrontato con quello patogenetico-clinico dei rimedi omeopatici e, dopo conferma del repertorio, si prescrive Iodum 30 CH, 3 granuli mattino e sera per 1 settimana, continuando per ora la terapia con Inderal.

Risultati

All'inizio della terapia la paziente ha un miglioramento immediato dei sintomi, ma di breve durata e quindi si aumenta progressivamente il dosaggio del farmaco, prima in dosi korsacoviane, fino alla LMK, poi in cinquantamillesimali, fino alla 60 LM.

Prosegue con il passare dei mesi il miglioramento, sia dei sintomi fisici, sia dei valori di laboratorio. A dicembre 2022 i valori sono tutti nella norma tranne l'anticorpo antirecettore del TSH, che è ancora lievemente sopra i valori di riferimento.

La paziente si sente bene e decide sospendere l'assunzione di Iodum.

Discussione – Nella paziente in esame la terapia con Iodum ha permesso di ristabilire il normale funzionamento della tiroide in una condizione clinica seria, riportandola ad un benessere psicofisico ottimale. Naturalmente la situazione andrà ancora monitorata, ma il risultato ottenuto finora è estremamente positivo.

Conclusioni - La valutazione di questo caso conferma che la medicina omeopatica può sostituire farmaci allopatrici con risultati totalmente positivi, senza andare incontro ad effetti collaterali indesiderati, come quelli possibili con farmaci inibenti la sintesi della tiroxina.

Parole chiave

Morbo di Graves-Basedow – Specificità del rimedio - Dosi elevate – Iodum